

副作用Grade評価の詳細

	grade 0	grade 1	grade 2	grade 3
食欲低下	なし	少しあるが、食事の量や内容は変わらない	食事の量や内容は変わったが体重はあまり変わらない	栄養が十分に摂れず、著明な体重減少がある
悪心	なし	少しあるが、食事の量や内容は変わらない	吐き気があって飲水や食事摂取が減っている	吐き気があり飲水や食事摂取が全くできない
味覚異常	なし	味覚の変化はあるが食事量や内容は変わらない	味覚の変化により食事量や内容に変化がある	
口腔粘膜炎	なし	症状は少しあるが、治療は必要ない	食事内容の変更が必要ない程度の痛みがある	痛みで食事摂取ができない
下痢	なし	普段より1～3回/日増えた	普段より4～6回/日増えた	普段より7回/日以上増え、間に合わないこともある
便秘	なし	時折下剤を使用する	定期的の下剤を使用する	定期的の下剤を使用しても排便がない
末梢神経障害	なし	違和感があるが、生活には支障がない	ピリピリ感、痛み、感覚の鈍さはあるが、身の回りのことに支障はない	身の回りのことに支障がある
皮膚障害	なし	痛みはないが乾燥や赤みがある	皮膚の亀裂や剥け、痛みはあるが身の回りのことに支障はない	痛みで身の回りのことに支障がある

※身の回りのこととは、入浴、着替、食事、排泄、内服など