

# レジメン一覧

2023/02/08 時点

10	CBDCA+PTX	レスタミン5錠内服。	1	20	<p>生食(100mL):1瓶 Day1                  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1                  デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1                  ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1                  グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1                  生食(500mL):1瓶 Day1                  パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):180mg/m<sup>2</sup> Day1                  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1                  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1                  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1                  生食(100mL):1瓶 Day1</p>
11	CBDCA+PTX+Bevacizumab	レスタミン5錠内服。ベバシズマブの投与時間は2回目60分、3回目以降30分に短縮可。	1	20	<p>生食(100mL):1瓶 Day1                  ベバシズマブBS点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1                  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1                  デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1                  ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1                  グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1                  生食(500mL):1瓶 Day1                  パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):180mg/m<sup>2</sup> Day1                  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1                  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1                  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1                  生食(100mL):1瓶 Day1                  ペバシズマブBS点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1                  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1                  デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1                  ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1                  グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1                  生食(500mL):1瓶 Day1                  パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):180mg/m<sup>2</sup> Day1                  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1                  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1                  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>
12	Weekly PTX+CBDCA+RT	レスタミン5錠内服。治療終了後、引き続きPTX(200mg/m <sup>2</sup> )+CBDCA(AUC5) day1のみ投与を2コース施行。	36	6	<p>生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36                  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36                  デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36                  ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36                  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36                  パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):40mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36                  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36                  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36                  生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36                  グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day22 Day29 Day36                  ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1</p>
20	CBDCA+PEM	投与7日前にメチコパール注1mg筋注(3コース毎に1回程度)、投与7日前よりパンヒタン1g内服(連日服用)。	1	20	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1                  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1                  生食(100mL):1瓶 Day1                  ペメトレキセド点滴静注液「トーワ」(規格なし):500mg/m<sup>2</sup> Day1                  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1                  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1                  ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1</p>
21	CBDCA+PEM+Bevacizumab	投与7日前にメチコパール注1mg筋注(3コース毎に1回程度)、投与7日前よりパンヒタン1g内服(連日服用)。	1	20	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1                  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1                  生食(100mL):1瓶 Day1                  ペメトレキセド点滴静注液「トーワ」(規格なし):500mg/m<sup>2</sup> Day1                  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1                  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1                  ベバシズマブBS点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1                  ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1</p>
40	CBDCA+GEM		8	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8                  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8                  生食(100mL):1瓶 Day1 Day8                  ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8                  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1                  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1                  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8</p>

50	CBDCA+CPT-11		15	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):50mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15  生食(100mL):1瓶 Day15</p>
60	CBDCA+VNR		8	20	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8  ロゼウス静注液(規格なし):20mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8  生食(100mL):1瓶 Day8</p>
70	CBDCA+S1	ティーエスワンはday1～14経口投与(2週投与1週休薬)。	1	20	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>
80	CBDCA+VP16		3	25	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3  生食(500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3  イトボシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット):100mg/m<sup>2</sup> Day1 Day2 Day3</p>
100	CBDCA+nab-PTX		15	13	<p>ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15  生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15  アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m<sup>2</sup> Day1 Day8 Day15  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1</p>
220	CDDP+PEM	アブレピタント(day1:125mg, day2,3:80mg)併用。投与7日前にメチコハール注1mg筋注, 投与7日前よりパンピタン1g内服	3	18	<p>ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1  デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1  生食(500mL):1瓶 Day1  シスプラチン点滴静注(規格なし):75mg/m<sup>2</sup> Day1  20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1  生食(100mL):1瓶 Day1  ペムトレキセド点滴静注液「トーワ」(規格なし):500mg/m<sup>2</sup> Day1  生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1  ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3  硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1</p>

221	CDDP+PEM(NSCLC)(ショートハイドレーション)	アブレピタント(day1:125mg, day2,3:80mg)併用。投与7日前にメチコハール注1mg筋注。投与7日前よりバンビタン1g内服。	1	20	生食(100mL瓶):1瓶 Day1 ハロ/セトロン点滴静注ハック0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):75mg/m <sup>2</sup> Day1 ペムトレキセド点滴静注「トーワ」(規格なし):500mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ソルデム1輸液(500mL袋):1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL):1キット Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液ハック1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day8 Day1 生食(100mL):1瓶 Day8 Day1 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day8 ハロ/セトロン点滴静注ハック0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m <sup>2</sup> Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1
230	CDDP+GEM	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	8	13	グラニセトロン点滴静注液ハック1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day8 Day15 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):60mg/m <sup>2</sup> Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day8 Day15 ハロ/セトロン点滴静注ハック0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m <sup>2</sup> Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1
240	CDDP+CPT-11(NSCLC)	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	15	13	グラニセトロン点滴静注液ハック1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day8 Day15 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):50mg/m <sup>2</sup> Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day8 Day15 ハロ/セトロン点滴静注ハック0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m <sup>2</sup> Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1
241	CDDP+CPT-11(NSCLC放射線併用)	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	15	13	グラニセトロン点滴静注液ハック1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day8 Day15 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):50mg/m <sup>2</sup> Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day8 Day15 ハロ/セトロン点滴静注ハック0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m <sup>2</sup> Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1

242	CDDP+CPT-11 (SCLC)	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	15	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day8 Day15  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day8 Day15  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):60mg/m<sup>2</sup> Day8 Day15  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day8 Day15  ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1  デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1  生食(500mL):1瓶 Day1  シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m<sup>2</sup> Day1  20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1  ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3  硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1</p>
243	CDDP+CPT-11 (SCLC放射線併用)	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	15	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day8 Day15  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day8 Day15  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):40mg/m<sup>2</sup> Day8 Day15  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day8 Day15  ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1  デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1  生食(500mL):1瓶 Day1  シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m<sup>2</sup> Day1  20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1  ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3  硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1</p>
244	CDDP+CPT-11 (NSCLC)(ショートハイドレーション)	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。食事等通常摂取+1000mL/dayの追加経口補給推奨(day1~3)	15	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day8 Day1  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day8 Day1 Day15  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):60mg/m<sup>2</sup> Day8 Day1 Day15  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day8  生食(100mL瓶):1瓶 Day1  ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1  デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1  生食(500mL瓶):1瓶 Day1  シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m<sup>2</sup> Day1  20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day15  ソルデム1輸液(500mL袋):1袋 Day1  アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL):1キット Day1  硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day15</p>

245	CDDP+OPT-11 (SCLC) (ショートハイドレーション)	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。食事等通常摂取+1000mL/dayの追加経口補給推奨(day1~3)	15	13	<p>グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL(HKJ):1袋 Day8 Day15  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day8 Day1  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day8 Day1 Day15  イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):60mg/m<sup>2</sup> Day8 Day1 Day15  生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day8  生食(100mL瓶):1瓶 Day1  ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1  デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1  生食(500mL瓶):1瓶 Day1  シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m<sup>2</sup> Day1  20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day15  ソルデム1輸液(500mL袋):1袋 Day1  アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL):1キット Day1  硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day15  生食(100mL):1瓶 Day8</p>
250	CDDP+VNR	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	8	20	<p>生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day8 Day1  ロゼウス静注液(規格なし):25mg/m<sup>2</sup> Day8 Day1  ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8  デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1  生食(500mL):1瓶 Day1  シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m<sup>2</sup> Day1  20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1  ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3  硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1</p>
260	CDDP+S1(放射線同時併用)	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。ティーエスワンはday1~14経口投与(2週投与2週休薬)。	3	25	<p>ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1  デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1  生食(500mL):1瓶 Day1  シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m<sup>2</sup> Day1  20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1  ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3  硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1  生食(100mL瓶):1瓶 Day1</p>
261	CDDP+S1(NSCLC) (ショートハイドレーション)	アブレピタント(day8:125mg, day9,10:80mg)併用。エスワンはday1~21経口投与。追加経口摂取1000mL/day(day8~10)	1	34	<p>ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1  デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1  生食(500mL瓶):1瓶 Day1  シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m<sup>2</sup> Day1  20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1  大塚生食注(250mL):1袋 Day1  ソルデム1輸液(500mL袋):1袋 Day1  硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1  アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL):1キット Day1  生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1</p>

270	CDDP+VP16(ショートハイドレーション)	アブレピタント(day1:125mg, day2,3:80mg)併用。食事等通常摂取+1000mL/dayの追加経口補給の推奨(day1~3)	3	25	生食(100mL瓶):1瓶 Day1 ハロセトロン点滴静注ハック0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液100mg「サント」(ラセット):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m <sup>2</sup> Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 ソルデム1輸液(500mL袋):1袋 Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL):1キット Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day2 Day3 ハロセトロン点滴静注ハック0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1
271	CDDP+VP-16	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	3	18	デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m <sup>2</sup> Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液100mg「サント」(5mL瓶):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day2 Day3
610	Nivolumab (q2w)		1	13	生食(100mL):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1
620	Nivolumab (q4w)		1	27	生食(100mL):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):2瓶 Day1
621	Nivolumab+Ipilimumab (Nivo q2w)		29	13	生食(100mL):1瓶 Day1 Day15 Day29 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day15 Day29 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1 Day15 Day29 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):20mL Day1 ヤーボイ点滴静注液50mg:1mg/kg Day1
622	Nivolumab+Ipilimumab (Nivo q3w)		22	20	生食(100mL):1瓶 Day1 Day22 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day22 オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1 Day22 オブジーボ点滴静注120mg(12mL瓶):1瓶 Day1 Day22 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):20mL Day1 ヤーボイ点滴静注液50mg:1mg/kg Day1



623	Nivolumab + Ipilimumab + CBDCA + PTX (導入)	レスタミン5錠内服。アプレピタント併用。1コース終了後、Nivolumab+Ipilimumab維持療法へ移行する。	22	20	<p>生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day22  生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day22  オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1 Day22  オブジーボ点滴静注120mg(12mL瓶):1瓶 Day1 Day22  生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):20mL Day1  ヤーボイ点滴静注液50mg:1mg/kg Day1  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):2瓶 Day1 Day22  デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 Day22  ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day22  グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day22  生食(500mL瓶):1瓶 Day1 Day22  パクリタキセル注「ホスピラ」(規格なし):200mg/m<sup>2</sup> Day1 Day22  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day22  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 Day22</p>
624	Nivolumab + Ipilimumab + CBDCA + PEM (導入)	メコハール注1mg筋注(3コース毎に1回程度)、ハンピタン1g内服(連日服用)。アプレピタント併用、1コース終了後維持(イピホ)	22	20	<p>生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day22  生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day22  オブジーボ点滴静注240mg(24mL瓶):1瓶 Day1 Day22  オブジーボ点滴静注120mg(12mL瓶):1瓶 Day1 Day22  生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):20mL Day1  ヤーボイ点滴静注液50mg:1mg/kg Day1  グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day22  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 Day22  ペムトレキシド点滴静注液「トーワ」(規格なし):500mg/m<sup>2</sup> Day1 Day22  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day22  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 Day22</p>
630	Pembrolizumab (q3w)		1	20	<p>生食(100mL):1瓶 Day1  キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1  グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1  デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1  ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1</p>
631	Pembrolizumab + CBDCA + PTX (導入)	ルート確保時、レスタミン5錠内服。アプレピタント(day1:125mg, day2,3:80mg)併用。4コース後、維持(Pembrolizumab)へ。	1	20	<p>生食(500mL):1瓶 Day1  パクリタキセル注「ホスピラ」(規格なし):200mg/m<sup>2</sup> Day1  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1  生食(100mL瓶):1瓶 Day1  キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1</p>
632	Pembrolizumab + CBDCA + PEM (導入)	メコハール注1mg筋注(3コース毎に1回程度)、ハンピタン1g(連日服用)。アプレピタント併用。4コース後、維持(Pembro+PEM)	1	20	<p>生食(100mL瓶):1瓶 Day1  キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1  グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1  生食(100mL):1瓶 Day1  ペムトレキシド点滴静注液「トーワ」(規格なし):500mg/m<sup>2</sup> Day1  大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1  カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1</p>
633	Pembrolizumab + PEM (維持)	投与7日前にメコハール注1mg筋注(3コース毎に1回程度)、投与7日前よりハンピタン1g内服(連日服用)。	1	20	<p>生食(100mL瓶):1瓶 Day1  キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1  グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1  デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1  生食(100mL):1瓶 Day1  ペムトレキシド点滴静注液「トーワ」(規格なし):500mg/m<sup>2</sup> Day1</p>
640	Pembrolizumab (q6w)		1	41	<p>生食(100mL):1瓶 Day1  キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):400mg Day1</p>

650	Atezolizumab	初回60分かけて投与し、忍容性よければ2回目以降は30分間まで短縮可。	1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL):1200mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
651	Atezolizumab+Bevacizumab+CBDCA+PTX(導入)	ﾊﾞﾝｽﾞﾏﾌBS点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1 ファミチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 グラニセトロン点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 ﾊﾞﾙｷﾀｷｾﾙ注「ﾎｽﾋﾞｰﾗ」(規格なし):200mg/m <sup>2</sup> Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1	1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 ﾊﾞﾝｽﾞﾏﾌBS点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 グラニセトロン点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液100mg「サント」(5mL瓶):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg/瓶:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day8 Day15 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 グラニセトロン点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ﾊﾞﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液「ﾄｰﾌﾞ」(規格なし):500mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1
652	Atezolizumab+Bevacizumab(維持)		1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
653	Atezolizumab+CBDCA+VP-16(導入)	ｱﾌﾞﾚﾋﾟﾀﾝﾄ(day1:125mg,day2-3:80mg)併用。4コース終了後、維持(Atezolizumab)。	3	18	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液100mg「サント」(5mL瓶):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg/瓶:100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day8 Day15 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 グラニセトロン点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ﾊﾞﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液「ﾄｰﾌﾞ」(規格なし):500mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1
654	Atezolizumab+CBDCA+nab-PTX(導入)	ｱﾌﾞﾚﾋﾟﾀﾝﾄ(day1:125mg,day2-3:80mg)併用。4又は6コース終了後、維持(Atezolizumab)。	15	6	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液100mg「サント」(5mL瓶):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 グラニセトロン点滴静注液ﾊﾞｯｸﾞ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ﾊﾞﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液「ﾄｰﾌﾞ」(規格なし):500mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1
655	Atezolizumab+CBDCA+PEM(導入)	ﾒﾁｺﾊﾞｰﾙ1mg筋注(9週毎に1回)、ﾊﾝﾋﾞﾀﾝ1g(連日服用)。ｱﾌﾞﾚﾋﾟﾀﾝﾄ併用。4又は6コース後、維持(Atezo+PEM)。	1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ﾊﾞﾒﾄﾚｷｾﾄﾞ点滴静注液「ﾄｰﾌﾞ」(規格なし):500mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1



656	Atezolizumab+PEM(維持)	投与7日前までにメコハール注1mg筋注(9週毎に1回)、投与7日以上前よりハンピタン1g内服(連日服用)。	1	20	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ペムトレキセド点滴静注液「トーワ」(規格なし):500mg/m <sup>2</sup> Day1
670	Durvalumab		1	13	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注液(規格なし):10mg/kg Day1
671	Durvalumab+CBDCA+VP-16(導入)	4コース後、維持療法(イミフィンジ単剤1,500mg 4週ごと)へ移行する。アプレビタント併用。	3	18	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注液500mg:3瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 Day2 Day3 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 イトボンド点滴静注液100mg「サント」(5mL瓶):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day2 Day3
672	Durvalumab+CDDP+VP-16(導入)(ショートハイドレーション)	4コース後、維持療法(イミフィンジ単剤1,500mg 4週ごと)へ移行する。アプレビタント(day1:125mg, day2,3:80mg)併用。	3	18	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注液500mg:3瓶 Day1 ハロセトロン点滴静注液バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 イトボンド点滴静注液100mg「サント」(5mL瓶):100mg/m <sup>2</sup> Day1 Day2 Day3 ソルデム1輸液(500mL袋):1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL):1キット Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):80mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3
673	Durvalumab(SCLC, 維持療法)	イミフィンジ+イトボンド+プラチン 導入療法後に使用。体重30kg以下の場合20mg/kg。	1	27	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注液(規格なし):1500mg Day1
410	DOC		1	20	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):60mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
420	PEM	投与7日前にメコハール注1mg筋注(3コース毎に1回程度)、投与7日前よりハンピタン1g内服(連日服用)。	1	20	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ペムトレキセド点滴静注液「トーワ」(規格なし):500mg/m <sup>2</sup> Day1
430	GEM		15	13	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day15 Day8 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day15 Day8 生食(100mL):1瓶 Day1 Day15 Day8 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day15 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day15 Day8

440	Weekly CPT-11	1週間毎に3~4回投与し、少なくとも2週間休薬。	1	6	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「ト-ワ」(規格なし):100mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day8 Day1
450	VNR		8	13	デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day8 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day8 Day1 ロゼウス静注液(規格なし):25mg/m <sup>2</sup> Day8 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day8 Day1
460	AMR		3	18	生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):20mL Day3 Day1 Day2 カルセド注射用(規格なし):45mg/m <sup>2</sup> Day3 Day1 Day2 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day3 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 生食(100mL):1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1
470	Topotecan		5	16	ハイカムチン注射用1.1mg:1mg/m <sup>2</sup> Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 生食(100mL):1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1
500	GEM+VNR		8	13	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液(規格なし):25mg/m <sup>2</sup> Day1 Day8 生食(100mL):1瓶 Day1
510	Bevacizumab (maintenance)	ベバシズマブは2回目60分、3回目以降30分に短縮可。	1	20	ベバシズマブBS点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
520	nab-PTX (weekly)		1	6	デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:100mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
530	DOC+Ramucirumab	サイラムザの投与時間は初回60分、2回目以降30分に短縮可。	1	20	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ポラミン注5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 サイラムザ点滴静注用(規格なし):10mg/kg Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):60mg/m <sup>2</sup> Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1