

レジメン一覧				2023/02/08 時点
310	Trastuzumab (初回)		1	20 生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):8mg/kg Day1
311	Trastuzumab (2回目以降)		1	20 生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1
362	TC75+Trastuzumab (初回)		1	20 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):75mg/m ² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 注射用インドキサン500mg:600mg/m ² Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):8mg/kg Day1
363	TC75+Trastuzumab (2回目以降)		1	20 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):75mg/m ² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 注射用インドキサン500mg:600mg/m ² Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1
372	DOC75+Trastuzumab (初回)		1	20 生食(100mL):1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):75mg/m ² Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):8mg/kg Day1
373	DOC75+Trastuzumab (2回目以降)		1	20 生食(100mL):1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):75mg/m ² Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1
382	DOC75+Trastuzumab+Pertuzumab (初回)		1	20 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):75mg/m ² Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):8mg/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:2瓶 Day1
383	DOC75+Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降)		1	20 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):75mg/m ² Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:1瓶 Day1

384	Trastuzumab+Pertuzumab(初回)		1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):8mg/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:2瓶 Day1
385	Trastuzumab+Pertuzumab(2回目以降)		1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:1瓶 Day1
390	T-DM1(Trastuzumab Emtansine)	初回90分かけて投与し、忍容性がよければ2回目以降は30分間まで短縮可。	1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.18mL/kg Day1 カドサイラ点滴静注用(規格なし):3.6mg/kg Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1
400	T-DM1(Trastuzumab Emtansine)(術後:上限14コース)	初回90分かけて投与し、忍容性がよければ2回目以降は30分間まで短縮可。上限14コース。	1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.18mL/kg Day1 カドサイラ点滴静注用(規格なし):3.6mg/kg Day1 ブドウ糖注射液5%(100mL瓶):1瓶 Day1
410	Trastuzumab deruxtecan	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。初回90分、忍容性がよければ2回目以降は30分間まで短縮可。	1	20	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 注射用水(20mL管):0.27mL/kg Day1 インハーツ点滴静注用100mg:5.4mg/kg Day1
421	TCbHP(初回)	アブレピタント(day1:125mg, day2-3:80mg)併用。6コースまで。	1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.38mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):8mg/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:2瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):75mg/m ² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1
422	TCbHP(2回目以降)	アブレピタント(day1:125mg, day2-3:80mg)併用。6コースまで。	1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用水(20mL管):0.285mL/kg Day1 トラスツズマブBS点滴静注用「ファイザー」(規格なし):6mg/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):75mg/m ² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1
20	EC100	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	1	20	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 塩酸エピルピシン注(規格なし):100mg/m ² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 注射用インドキサン500mg:600mg/m ² Day1

21	EC60	アプレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	1	20	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 塩酸エピルピシン注(規格なし):60mg/m ² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:600mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1
22	dose dense EC90	アプレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	1	13	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 塩酸エピルピシン注(規格なし):90mg/m ² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:600mg/m ² Day1
40	Weekly PTX	レスタミン錠内服。	1	6	生食(100mL):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):80mg/m ² Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1
41	Weekly PTX+Bevacizumab	レスタミン錠内服。ベバシズマブの投与時間は初回90分、2回目以降60分に短縮可。	15	13	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):80mg/m ² Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 ベバシズマブBS点滴静注用(規格なし):10mg/kg Day1 アバステン点滴静注用(規格なし):10mg/kg Day15
42	dose dense PTX	2週毎、4コース行う。フィルター付き輸液セットを使用する。レスタミン錠内服。	1	13	生食(100mL):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):175mg/m ² Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1
61	DOC75		1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):75mg/m ² Day1
70	VNR		8	13	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 ロゼウス静注液(規格なし):25mg/m ² Day1 Day8
80	GEM		8	13	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1250mg/m ² Day1 Day8

91	TC75 (Docetaxel+Cyclophosphamide)		1	20	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):75mg/m ² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 注射用インドキサン500mg:600mg/m ² Day1
110	nab-PTX		1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 アブラキサン点滴静注用100mg:260mg/m ² Day1
120	Eriburin		8	13	生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 ハラヴェン静注1mg:1.4mg/m ² Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8
130	Atezolizumab+nab-PTX	テセントリクは初回60分かけて投与し、忍容性よければ2回目以降は30分間まで短縮可。	15	13	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day15 テセントリク点滴静注840mg(14mL瓶):1瓶 Day1 Day15 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day8 Day15 生食(100mL瓶):1瓶 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg/瓶:100mg/m ² Day8 Day15 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day22 Day43 Day64
140	Pembrolizumab+Weekly PTX	レスタミン5錠内服。	71	13	グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day36 Day29 Day57 Day71 Day43 Day64 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day36 Day29 Day57 Day71 Day43 Day64 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 Day36 Day29 Day57 Day71 Day43 Day64 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 Day36 Day29 Day57 Day71 Day43 Day64 パクリタキセル注「ホスピラ」(規格なし):90mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day36 Day29 Day57 Day71 Day43 Day64
141	Pembrolizumab+GC		8	13	生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day8 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液5%(100mL瓶):1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液「NK」(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 生食(100mL):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day8 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 Day8
143-1	TCb+Pembrolizumab	アブレピタント(day1:125mg, day2-3:80mg)併用。術前4コース実施後、EC+Pembroへ。レスタミン5錠内服。	15	6	大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1 Day8 Day15 グラニセロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ホスピラ」(規格なし):80mg/m ² Day1 Day8 Day15 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 生理食塩液PL「フナー」(100mL/瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1
143-2	EC+Pembrolizumab	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。術前TCb+Pembro 4コース実施後に使用。術後Pembro 9コースへ。	1	20	大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 塩酸エピルビシン注(規格なし):90mg/m ² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 注射用インドキサン500mg:600mg/m ² Day1 生理食塩液PL「フナー」(100mL/瓶):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1

143-3	Pembrolizumab (q3w)	術前TCb+Pembro 4コース→EC+Pembro 4コース後、術後、本レジメンを9コース実施す	1	20	生食(100mL):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1
-------	---------------------	-------------------------------------------------------	---	----	------------------------------------------------------------