

レジメン一覧				2023/02/08 時点
311	FOLFIRI+Biweekly-Cetuximab	Cetuximabは初回2時間、忍容性がよければ2回目以降は1時間に短縮可。	1	13 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m ² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリップチップ):1筒 Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液(100mg/20mL):500mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:400mg/m ² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m ² Day1 グラニセトロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1
312	CPT-11+Biweekly-Cetuximab	Cetuximabは初回2時間、忍容性がよければ2回目以降は1時間に短縮可。	1	13 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液(100mg/20mL):500mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m ² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
313	Biweekly Cetuximab	Cetuximabは初回2時間、忍容性がよければ2回目以降は1時間に短縮可。	1	13 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液(100mg/20mL):500mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
210	FOLFIRI		1	13 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:400mg/m ² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m ² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリップチップ):1筒 Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m ² Day1
220	FOLFIRI+Bevacizumab	ベバシズマブの投与時間は初回90分、2回目以降60分に短縮可。	1	13 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:400mg/m ² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m ² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリップチップ):1筒 Day1 ベバシズマブBS点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m ² Day1

230	FOLFIRI+Cetuximab(1コース目)	8	6	大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m ² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリッチップ):1筒 Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液(100mg/20mL):400mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:400mg/m ² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m ² Day1 アービタックス注射液(100mg/20mL):250mg/m ² Day8
231	FOLFIRI+Cetuximab(2コース目以降)	8	6	大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m ² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリッチップ):1筒 Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液(100mg/20mL):250mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:400mg/m ² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m ² Day1
240	FOLFIRI+Panitumumab	1	13	ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:400mg/m ² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m ² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリッチップ):1筒 Day1 ベクティビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1
250	CPT-11+Cetuximab(1コース目)	8	6	レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m ² Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液(100mg/20mL):400mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m ² Day1 生食(100mL):1瓶 Day8 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day8 アービタックス注射液(100mg/20mL):250mg/m ² Day8

251	CPT-11 + Cetuximab (2コース目以降)		8	6	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 アービタックス注射液(100mg/20mL):250mg/m² Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day8 生食(100mL):1瓶 Day1</p>
260	CPT-11 + Panitumumab		1	13	<p>ベクティビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m² Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day15 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):125mg/m² Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day15</p>
270	IRIS	テーエスワンは80mg/m ² をday1~14経口投与(2週投与2週休薬)。	15	13	<p>ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 パバンスマブBS点滴静注用(規格なし):7.5mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>
280	SIR + Bevacizumab	パバンスマブの投与時間は初回90分、2回目以降60分に短縮可。S1は80mg/m ² をday1~14経口投与(2投与1休)。	1	20	<p>ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 パバンスマブBS点滴静注用(規格なし):7.5mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>
281	CapeIRI + Bevacizumab	パバンスマブは2回目60分、3回目以降30分に短縮可。カペシタビンは1600mg/m ² /dayをday1~14経口投与(2投与1休)。	1	20	<p>ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):200mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 パバンスマブBS点滴静注用(規格なし):7.5mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>
290	FOLFIRI + Ramucirumab	サイラムザの投与時間は初回60分、2回目以降30分に短縮可。	1	13	<p>ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ポラミン注5mg:1管 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:400mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリッパチップ):1筒 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 サイラムザ点滴静注用(規格なし):8mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m² Day1</p>

300	FOLFIRI+Aflibercept		1	13	<p>ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):180mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:400mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリップチップ):1筒 Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 ザルトラップ点滴静注(規格なし):4mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m² Day1</p>
440	mFOLFOXIRI		1	13	<p>ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリップチップ):1筒 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m² Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m² Day1</p>
443	mFOLFOXIRI+Bevacizumab(導入療法)	最大12コース。ベバシズマブの投与時間は初回90分,2回目以降60分,3回目以降30分に短縮可。	1	13	<p>大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリップチップ):1筒 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m² Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 ホスアプレビタント点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m² Day1 ベバシズマブBS点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1</p>
444	modifiedFL+Bev(維持療法)	ベバシズマブの投与時間は初回90分,2回目以降60分,3回目以降30分に短縮可。	1	13	<p>レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリップチップ):1筒 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ベバシズマブBS点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1</p>
10	mFOLFOX6		1	13	<p>ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:400mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリップチップ):1筒 Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m² Day1</p>

20	mFOLFOX6 + Bevacizumab	ペバシズマブの投与時間は初回90分、2回目以降60分に短縮可。	1	13	<p>ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:400mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリップチップ):1筒 Day1 ペバシズマブBS点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m² Day1</p>
30	mFOLFOX6 + Panitumumab		1	13	<p>ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:400mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリップチップ):1筒 Day1 ベクティビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m² Day1</p>
40	FOLFOX4		2	12	<p>ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day2 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:400mg/m² Day1 Day2 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:600mg/m² Day1 Day2 生食(20mL):1管 Day2 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):100mg/m² Day2 Day1</p>
50	FOLFOX4 + Bevacizumab	ペバシズマブの投与時間は初回90分、2回目以降60分に短縮可。	2	12	<p>ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day2 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:400mg/m² Day1 Day2 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:600mg/m² Day1 Day2 生食(100mL):1瓶 Day1 ペバシズマブBS点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1 生食(20mL):1管 Day2 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):100mg/m² Day2 Day1</p>
60	CapeOX	カペシタヒンは2000mg/m ² をday1の夕からday15の朝まで内服(2週投与1週休業)。	1	20	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>

70	CapeOX + Bevacizumab	カベシタピンは2000mg/m ² をday1の夕からday15の朝まで内服。ヘパシスマブは2回目60分、3回目以降30分に短縮可。	1	20	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ヘパシスマブBS点滴静注用(規格なし):7.5mg/kg Day1
80	SOX	ティーエスワンは80mg/m ² をday1～14経口投与(2週投与1週休薬)。	1	20	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
90	SOX + Bevacizumab	ティーエスワンは80mg/m ² をday1～14経口投与(2週投与1週休薬)。ヘパシスマブは2回目60分、3回目～30分に短縮可。	1	20	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):130mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ヘパシスマブBS点滴静注用(規格なし):7.5mg/kg Day1
410	Cetuximab(初回)		1	6	デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液(100mg/20mL):400mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
411	Cetuximab(2回目以降)		1	6	デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液(100mg/20mL):250mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
415	Cetuximab(初回) + Encorafenib ± Binimetinib		1	6	デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液(100mg/20mL):400mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
416	Cetuximab(2回目以降) + Encorafenib ± Binimetinib		1	6	デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 アービタックス注射液(100mg/20mL):250mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
420	Panitumumab		1	13	ベクティビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
421	Panitumumab(デキサートあり)		1	13	ベクティビックス点滴静注100mg:6mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1

430	5FU+LV (sLV5FU2法)		1	13	<p>ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「トロー」(規格なし):200mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トロー」:400mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トロー」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリッチップ):1筒 Day1</p>
431	5FU+LV(RPMI法)	1コースは、週1回、6週連続投与2週休業。	1	6	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「トロー」(規格なし):250mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トロー」:600mg/m² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「トロー」(規格なし):200mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トロー」:400mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トロー」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリッチップ):1筒 Day1</p>
450	FL+Bevacizumab (bolusあり)	ベバシズマブの投与時間は初回90分、2回目以降60分に短縮可。	1	13	<p>大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「トロー」(規格なし):200mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トロー」:400mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トロー」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリッチップ):1筒 Day1 ベバシズマブBS点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ベバシズマブBS点滴静注用(規格なし):7.5mg/kg Day1</p>
460	Bevacizumab+経口フッ化ピリミジン系抗がん薬	ベバシズマブは2回目60分、3回目以降30分に短縮可。	1	20	<p>生食(100mL):1瓶 Day1 ベバシズマブBS点滴静注用(規格なし):7.5mg/kg Day1</p>
470	Bevacizumab+トリフルリジン/チピラシル	ロンサーフは35mg/m ² をday1~5,8~12まで内服。ベバシズマブは2回目60分、3回目以降30分に短縮可。	15	13	<p>生食(100mL):1瓶 Day1 Day15 ベバシズマブBS点滴静注用(規格なし):5mg/kg Day1 Day15</p>
480	Trastuzumab+Pertuzumab (初回) (大腸癌)	トラスツズマブは先行品のみ適応あり(緊急採用薬願いが必要)。	1	20	<p>生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ハーセプチン注射用(規格なし):8mg/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:2瓶 Day1</p>
481	Trastuzumab+Pertuzumab (2回目以降) (大腸癌)	トラスツズマブは先行品のみ適応あり(緊急採用薬願いが必要)。	1	20	<p>生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ハーセプチン注射用(規格なし):6mg/kg Day1 パージェタ点滴静注420mg/14mL:1瓶 Day1</p>
10	5FU+MMC+RT		32	3	<p>生食(100mL):1瓶 Day1 Day29 ラクテック注 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day29 Day30 Day31 Day32 Day4 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day29 Day30 Day31 Day32 Day4 フルオロウラシル注1000mg「トロー」:1000mg/m² Day1 Day2 Day29 Day30 Day31 Day32 Day4 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day2 Day29 Day30 Day31 Day32 Day1 Day4 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day2 Day30 Day31 Day32 Day4 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day29 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day29 Day1 マイトマイシン注用10mg:10mg/m² Day29 Day1</p>

11	5FU+MMC+RT (q4w)		4	24 生食(100mL):1瓶 Day1 ラクテック注 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 フルオロウラシル注1000mg「トール」:1000mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day2 Day1 Day3 Day4 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 マイトマイシン注用10mg:10mg/m ² Day1
----	------------------	--	---	---