

レジメー一覧				2023/02/08 時点
18	Ramucirumab (肝)	サイラムザの投与時間は初回60分、2回目以降30分に短縮可。	1	13 生食(100mL):1瓶 Day1 ボラミン注5mg:1管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 サイラムザ点滴静注用(規格なし):8mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
21	Atezolizumab + Bevacizumab	テセントリクの投与時間は、2回目以降30分に短縮可。アバスタンの投与時間は、2回目60分、3回目以降30分に短縮可。	1	20 生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 テセントリク点滴静注1200mg(20mL瓶):1200mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 アバスタン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL:1筒 Day1
10	5FU + I-LV		1	6 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-7」:400mg/m ² Day1 レボホリナート点滴静注用「ト-7」(規格なし):200mg/m ² Day1 ヘパリンNaロック用100単位/mL シリンジ10mL:1筒 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
20	FEM-B		5	2 生食(20mL):15mL Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 ヘパリンナトリウム注N5千単位/5mL「AY」:1mL Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 フルオウラシル注1000mg「ト-7」:250mg Day2 Day3 Day4 Day5 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食(20mL):1管 Day1 エピルピシン塩酸塩注射液10mg「NK」:20mg Day1 注射用水 (20mL):1管 Day1 マイトマイシン注用10mg:6mg Day1 ラクテック注 (500mL):1袋 Day1 Day8
15	GC		8	13 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 シスプラチン点滴静注(規格なし):25mg/m ² Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5%100mL):1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day8 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day8
19	GEM + S1 (胆道)	S1は体表面積に基づき60, 80, 100mg/body(60mg/m ²)をday1~14経口投与(2週投与1週休業)。	8	13 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5%100mL):1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 ラクテック注 (500mL):1袋 Day1 Day8
22-1	Durvalumab + GC	最大8コース後、9コース目からはDurvalumab(維持療法)へ移行する。イミフィンは体重30kg以下の場合20mg/kg。	8	13 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 シスプラチン点滴静注(規格なし):25mg/m ² Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5%100mL):1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day8 ソルデム1輸液 (500mL):1袋 Day1 Day8 大塚生食注(250mL/袋):1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注液500mg:1500mg Day1
22-2	Durvalumab (維持療法)	Durvalumab + GC療法後に使用。イミフィンは体重30kg以下の場合20mg/kg。	1	27 生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 イミフィンジ点滴静注液(規格なし):1500mg Day1

11	GEM		15	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5%100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m² Day1 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15</p>
12	GEM+S1	ティーエスワンは80mg/m ² をday1~14経口投与(2週投与1週休薬)。	8	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液 (5%100mL):1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m² Day1 Day8 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1</p>
14	FOLFIRINOX		1	13	<p>オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m² Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):180mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:400mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m² Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリッパチップ):1筒 Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m² Day1</p>
15	nab-PTX+GEM		15	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 アブラキサン点滴静注用100mg:125mg/m² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液 (5%100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m² Day1 Day8 Day15 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1</p>
16	mFOLFIRINOX		1	13	<p>オキサリプラチン点滴静注液(規格なし):85mg/m² Day1 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):150mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリッパチップ):1筒 Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 ホスアプレピタント点滴静注用150mg「NK」/瓶:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m² Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day15</p>
17	IRIS	ティーエスワンは80mg/m ² をday1~14経口投与(2週投与2週休薬)。	15	13	<p>大塚糖液5%(250mL):1袋 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):100mg/m² Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day15</p>
20	Nanoliposomal CPT-11+LV+5-FU	UGT1A1*6 or UGT1A1*28 のホモ接合体、又は UGT1A1*6 及び UGT1A1*28 のヘテロ接合体を有する患者は50mg/m ² 開始	1	13	<p>ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ブドウ糖注射液5%(500mL袋):1袋 Day1 オニバイド点滴静注43mg(10mL瓶):70mg/m² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 レボホリナート点滴静注用「トーワ」(規格なし):200mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フルオロウラシル注1000mg「トーワ」:2400mg/m² Day1 生食注シリンジ「テルモ」10mL(スリッパチップ):1筒 Day1</p>