

レジメナー覧				2023/02/08 時点
24	TC (PTX+CBDCA)	ルート確保時, レスタミン錠内服。アブレピタント (day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	1	20 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピーラ」(規格なし):180mg/m ² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ホスピーラ」(規格なし):80mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):70mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m ² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):70mg/m ² Day1 ソルデム1輸液(500mL袋):1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL):1キット Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ドキソリビシン塩酸塩注射液(規格なし):60mg/m ² Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):50mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1
25	Weekly TC (PTX+CBDCA)	ルート確保時, レスタミン錠内服。デキサートは1回目6.6mg, 副作用なければ2回目以降3.3mgに減量。	15	13 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ホスピーラ」(規格なし):80mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):70mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m ² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):70mg/m ² Day1 ソルデム1輸液(500mL袋):1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL):1キット Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ドキソリビシン塩酸塩注射液(規格なし):60mg/m ² Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):50mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1
26	DOC		1	27 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):70mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m ² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):70mg/m ² Day1 ソルデム1輸液(500mL袋):1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL):1キット Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ドキソリビシン塩酸塩注射液(規格なし):60mg/m ² Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):50mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1
53	DP (DOC+CDDP) (ショートハイドレーション)	アブレピタント(day1:125mg, day2,3:80mg)併用。食事等通常摂取+1000mL/dayの追加経口補給の推奨(day1~3)	1	20 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):60mg/m ² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):70mg/m ² Day1 ソルデム1輸液(500mL袋):1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 アスパラギン酸カリウム注10mEqキット「テルモ」(10mL):1キット Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ドキソリビシン塩酸塩注射液(規格なし):60mg/m ² Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):50mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1
54	Pembrolizumab + Lenvatinib	Lenvatinibは1日1回連日経口投与。	1	20 キイトルーダ点滴静注100mg(100mg/4mL):200mg Day1 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ドキソリビシン塩酸塩注射液(規格なし):60mg/m ² Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):50mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1
27-1	AP (DXR+CDDP)	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	3	25 ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ドキソリビシン塩酸塩注射液(規格なし):60mg/m ² Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):50mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1

27-2	AP (DXR+CDDP) (ショートハイドレーション)	アプレピタント(day1:125mg, day2,3:80mg)併用。食事等通常摂取+1000mL/dayの追加経口補給の推奨(day1~3)	1	27	生食(100mL瓶):1瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用(規格なし):60mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):50mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1
34	GEM+DOC			8	13 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 ブドウ糖注射液(5%100mL):1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day8 トセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):80mg/m ² Day8
35	DXR		1	20	ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用(規格なし):60mg/m ² Day1 ソリューゲンF注500mLソフトバッグ:1袋 Day1
39	IFM			5	23 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 メイロン(7%20mL):1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ウロミテキサン注400mg:300mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 イホマイド1g[注射用]:1.5g/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3
50	IFM+PTX	ルート確保時、レスタミン5錠内服。アプレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。day4~フィルグラスチム併用。	3	18	メイロン(7%20mL):1管 Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注400mg:300mg/m ² Day1 Day2 Day3 イホマイド1g[注射用]:1.6g/m ² Day1 Day2 Day3 ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 バクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):135mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
28	TC (PTX+CBDCA)	ルート確保時、レスタミン5錠内服。アプレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	1	20	デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 バクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):180mg/m ² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1

29	Weekly TC (PTX+CBDCA)	ルート確保時, レスタミン錠内服。デキサートは1回目6.6mg, 副作用なければ2回目以降3.3mgに減量。	15	13	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 バクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):80mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 Day8 Day15
30	Weekly CPT-11		15	13	ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 生食(500mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15
31	CPT-11+MMC		15	13	ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 生食(20mL):1管 Day1 マイトマイシン注用10mg:10mg/m ² Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15
32	NDP	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	1	27	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 アクブラ静注用(規格なし):80mg/m ² Day1 ソリューゲンG注500mLソフトバッグ:1袋 Day1 ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1
36	CBDCA+RT		1	6	ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
40	CPT-11+NDP	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	8	13	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 生食(500mL):1瓶 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):60mg/m ² Day1 Day8 アクブラ静注用(規格なし):80mg/m ² Day1 ソリューゲンG注500mLソフトバッグ:1袋 Day1 ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8
45	NDP+RT	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	1	6	ハロ/セトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day8 グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 アクブラ静注用(規格なし):30mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1

48	CDDP+Topotecan	アブレヒタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	3	18	<p>ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):50mg/m² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 ハイカムチン注射用1.1mg:0.75mg/m² Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>
49	TC (PTX+CBDCA) +Bevacizumab	ルート確保時、レスタミン5錠内服。アブレヒタント併用。アバスタチンは初回90分、2回目60分、3回目~30分で投与可。	1	20	<p>デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):175mg/m² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 アバスタチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1 ラクテック注(500mL):1袋 Day1 ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):40mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フロセミド注20mg「トーワ」(ラシックス):1管 Day1 ソリューゲンG注500mLソフトバッグ:1袋 Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1</p>
33-1	CDDP+RT	アブレヒタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	1	6	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):40mg/m² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 フロセミド注20mg「トーワ」(ラシックス):1管 Day1 ソリューゲンG注500mLソフトバッグ:1袋 Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1</p>
33-2	CDDP+RT(ショートハイドレーション)	アブレヒタント(day1:125mg, day2,3:80mg)併用。食事等通常摂取+1000mL/dayの追加経口補給の推奨(day1-3)	1	6	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):40mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1</p>
46-1	TP (PTX+CDDP) (day 1のみ)	ルート確保時、レスタミン5錠内服。アブレヒタント併用。	3	18	<p>ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):175mg/m² Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):50mg/m² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1</p>

46-2	TP (PTX+CDDP) (ショートハイドレーション)	アブレヒタント(day1:125mg, day2,3:80mg)併用。食事等通常摂取+1000mL/dayの追加経口補給の推奨(day1~3)	1	20	生食(100mL瓶):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):175mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):50mg/m ² Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 ハロ/セロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホ」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):175mg/m ² Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):50mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 アバステチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1
47-1	TP (PTX+CDDP) + Bevacizumab	ルート確保時、レスタミン錠内服。アブレヒタント併用。アバステチンは初回90分、2回目60分、3回目~30分で投与可。	3	18	生食(100mL瓶):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):175mg/m ² Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):50mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):1袋 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 アバステチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1
47-2	TP (PTX+CDDP) + Bevacizumab (ショートハイドレーション)	アブレヒタント(day1:125mg, day2,3:80mg)併用。食事等通常摂取+1000mL/dayの追加経口補給の推奨(day1~3)	1	20	生食(100mL瓶):1瓶 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):175mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ソルデム3A輸液(500mL袋):1袋 Day1 硫酸Mg補正液1mEq/mL(20mL管):10mL Day1 20%マンニトール注射液「YD」(300mL袋):200mL Day1 シスプラチン点滴静注(規格なし):50mg/m ² Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 アバステチン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1
10	TC (PTX+ CBDCA)	ルート確保時、レスタミン錠内服。アブレヒタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	1	20	生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 グラニセロン点滴静注バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):175mg/m ² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1

11	Weekly TC ①(PTX,CBDCA共にWeekly)	ルート確保時, レスタミン5錠内服。デキサートは1回目6.6mg, 副作用なければ2回目以降3.3mgに減量。	15	13	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):80mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1 Day8 Day15
12	Weekly TC ②(PTXのみWeekly)	ルート確保時, レスタミン5錠内服。アプレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。デキサートは2回目以降3.3mgに減量可	15	6	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):80mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1
13	Bi-Weekly PTX	ルート確保時, レスタミン5錠内服。デキサートは1回目6.6mg, 副作用なければ2回目以降3.3mgに減量。	1	13	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 パクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):80mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
14	DOC		1	27	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):70mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1
16	Weekly CPT-11		15	13	ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 生食(500mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15
17	CPT-11+MMC		15	13	ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 生食(20mL):1管 Day1 マイトマイシン注用10mg:10mg/m ² Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 Day8 Day15 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):100mg/m ² Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15
18	CPT-11+DOC	アプレピタント(day8:125mg, day9~10:80mg)併用。	8	20	ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 生食(500mL):1瓶 Day1 Day8 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):60mg/m ² Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 大塚生食注(250mL):1袋 Day8 ドセタキセル点滴静注「EE」(規格なし):60mg/m ² Day8
19	Liposomal DXR		1	27	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 ドキシル注20mg:40mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液(5%100mL):1瓶 Day1

46	Weekly TC (PTX+ CBDCA) + Bevacizumab	ルート確保時、レスタミン5錠内服。アプレピタント (day1:125mg, day2,3:80mg)併用。デキサートは2回目以降3.3mgに減量可	15	6	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15</p> <p>デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15</p> <p>ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15</p> <p>生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 Day15</p> <p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day8 Day15</p> <p>バクリタキセル注「ホスピール」(規格なし):80mg/m² Day1 Day8 Day15</p> <p>生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15</p> <p>大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1</p> <p>カルボプラチン点滴静注液(規格なし):0mg/A Day1</p> <p>アバステン点滴静注用(規格なし):15mg/kg Day1</p>
10	MTX (筋肉内投与)		5	9	<p>注射用水(20mL管):0.016mL/kg Day2 Day3 Day4 Day5 Day1</p> <p>注射用メソトレキセート50mg/瓶:0.4mg/kg Day2 Day3 Day4 Day5 Day1</p> <p>生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day2 Day3 Day4 Day5 Day1</p> <p>ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p> <p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p> <p>デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p> <p>大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p> <p>シスプラチン点滴静注(規格なし):20mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p> <p>ソリューゲンF注500mLソフトバッグ:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p> <p>エトポシド点滴静注液100mg「サント」(ラセット):100mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p> <p>生食(100mL):1瓶 Day2 Day9 Day16</p> <p>プレオ注射用(規格なし):20mg/m² Day2 Day9 Day16</p> <p>フロセミド注20mg「トーワ」(ラシックス):0.5管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p> <p>ラクテック注 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5</p>
10	BEP	アプレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。必要によりday4~5(80mg)まで追加可能。	16	5	