

レジメン一覧				2023/02/08 時点
10	Rituximab 100mg/body	リツキサン投与開始30分前に、ロキソプロフェンNa60mg1錠とオロパタジン5mg1錠内服。	1	0 生食(100mL):90mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」(規格なし):100mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
11	Rituximab 400mg/body	リツキサン投与開始30分前に、ロキソプロフェンNa60mg1錠とオロパタジン5mg1錠内服。	1	0 生食(100mL):1瓶 Day1 生食(500mL):360mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」(規格なし):400mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
12	Rituximab 500mg/body	リツキサン投与開始30分前に、ロキソプロフェンNa60mg1錠とオロパタジン5mg1錠内服。	1	0 生食(500mL):450mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」(規格なし):500mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
13	Rituximab 600mg/body	リツキサン投与開始30分前に、ロキソプロフェンNa60mg1錠とオロパタジン5mg1錠内服。	1	0 生食(500mL):500mL Day1 生食(20mL):40mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」(規格なし):600mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
14	Rituximab 700mg/body	リツキサン投与開始30分前に、ロキソプロフェンNa60mg1錠とオロパタジン5mg1錠内服。	1	0 生食(100mL):90mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」(規格なし):100mg Day1 生食(500mL):500mL Day1 生食(20mL):40mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」(規格なし):600mg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
15	Rituximab 800mg/body	リツキサン投与開始30分前に、ロキソプロフェンNa60mg1錠とオロパタジン5mg1錠内服。	1	0 大塚生食注(250mL):180mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」(規格なし):200mg Day1 生食(500mL):500mL Day1 生食(20mL):40mL Day1 リツキシマブBS点滴静注「KHK」(規格なし):600mg Day1
16	CHOP	day1～5にプレドニン100mg/日内服を併用。アプレピタント併用は主治医判断。投与間隔は3週毎。	1	19 グラネセトロン点滴静注液ハッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オンコピン注射用1mg:1.4mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:750mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用(規格なし):50mg/m ² Day1
17	Bi-Weekly CHOP	day1～5にプレドニン100mg/日内服を併用。アプレピタント併用は主治医判断。投与間隔は2週毎。G-CSFによるフォロー必要	1	12 グラネセトロン点滴静注液ハッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オンコピン注射用1mg:1.4mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:750mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用(規格なし):50mg/m ² Day1
19	CCD		3	18 グラネセトロン点滴静注液ハッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):5瓶 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day2 Day3 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「T-7」(規格なし):25mg/m ² Day1 Day2 Day3 生食(500mL):1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):250mg/m ² Day1

20	CMD		3	18	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):5瓶 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day2 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トーワ」(規格なし):25mg/m² Day1 Day2 大塚生食注(250mL):1袋 Day3 ノバントロン注10mg(5mL瓶):8mg/m² Day3 生食(100mL):1瓶 Day1 Day2</p>
21	Bendamustine		2	19	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1 Day2 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day2 トリアキシン点滴静注液100mg(4mL瓶):120mg/m² Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day15 プレオ注射用(規格なし):10mg/m² Day1 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day15 エクザール注射用10mg:6mg/m² Day1 Day15 ドキシソルピシン塩酸塩注射用(規格なし):25mg/m² Day1 Day15 ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1 Day15 生食(500mL):1瓶 Day1 Day15 注射用水(20mL管):37.5mL/m² Day1 ダカルバジン注用100:375mg/m² Day1 Day15 注射用水(20mL管):2管 Day15</p>
22	ABVD	主治医判断で7フレドニン(day1~3, 15~17)併用。	15	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用(規格なし):30mg/m² Day1 注射用サイメリン50mg:60mg/m² Day1 水溶性ブレドニン(規格なし):40mg/m² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1</p>
23	AMP		1	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day5 Day1 Day2 Day3 Day4 生食(500mL):1瓶 Day5 注射用エンドキサン500mg:750mg/m² Day5 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 オンコピン注射用1mg:0.4mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 ドキシソルピシン塩酸塩注射用(規格なし):10mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4 イトボンド点滴静注液100mg「サンド」(5mL瓶):50mg/m² Day1 Day2 Day3 Day4</p>
24	EPOCH	day1~5のフレドニン(60mg/m ²)経口併用可。	5	16	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 注射用フィルデシン(規格なし):2.4mg/m² Day1 ブドウ糖注射液5%(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 イトボンド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット):100mg/m² Day1 Day2 Day3 生食(500mL):1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):250mg/m² Day1 水溶性ブレドニン50mg:50mg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3</p>
25	VECP	day2, 3のフレドニンは経口投与。	3	25	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 注射用フィルデシン(規格なし):2.4mg/m² Day1 ブドウ糖注射液5%(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 イトボンド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット):100mg/m² Day1 Day2 Day3 生食(500mL):1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):250mg/m² Day1 水溶性ブレドニン50mg:50mg Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3</p>

26	VCAP-AMP-VECP	day2~6, 9~13, 18~27にG-CSF投与。day16, 17のプレドニンは経口投与。	17	11	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15 Day16 Day17 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 オンコピン注射用1mg:1mg/㎡ Day1 ドキシルピシン塩酸塩注射用(規格なし):40mg/㎡ Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:350mg/㎡ Day1 水溶性プレドニン(規格なし):40mg/㎡ Day1 Day8 Day15 ドキシルピシン塩酸塩注射用(規格なし):30mg/㎡ Day8 注射用サイメリン50mg:60mg/㎡ Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day8 Day15 Day16 Day17 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day15 注射用フィルデシン(規格なし):2.4mg/㎡ Day15 ブドウ糖注射液5%(500mL袋):1袋 Day15 Day16 Day17 イトボシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット):100mg/㎡ Day15 Day16 Day17 生食(500mL):1瓶 Day15 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):250mg/㎡ Day15</p>
27	MPV	塩酸プロカルバジン(100mg/m ² /dayを2-3分割)は、MTX投与前日から7日間内服、ただし奇数サイクルのみ	5	8	<p>カルボプラチン点滴静注液(規格なし):250mg/㎡ Day15 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 ロイコポリン注3mg(1mL管):15mg/㎡ Day2 Day4 Day5 Day3 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL瓶):3500mg/㎡ Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 オンコピン注射用1mg/瓶:1.4mg/㎡ Day1</p>
48	GDP		8	13	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day8 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):5瓶 Day1 Day2 Day3 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注(規格なし):25mg/㎡ Day1 Day2 Day3 生食(100mL):1瓶 Day1 Day8 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/㎡ Day1 Day8 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 Day8 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day8 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3</p>
49	DeVIC	放射線療法と同時に実施する場合は、2/3量に減量。	3	18	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):5瓶 Day1 Day2 Day3 生食(100mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注400mg:1管 Day1 Day2 Day3 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 イホマイド1g[注射用]:1.5g/㎡ Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液(5%500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット):100mg/㎡ Day1 Day2 Day3 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):300mg/㎡ Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 Day2 Day3</p>
50	MINE		3	18	<p>ノバントロン注10mg(5mL瓶):8mg/㎡ Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 ウロミテキサン注400mg:1管 Day1 Day2 Day3 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 イホマイド1g[注射用]:1.33g/㎡ Day1 Day2 Day3 ブドウ糖注射液5%(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット):65mg/㎡ Day1 Day2 Day3</p>

51	THP-COP	プレドニ30mg/m ² /日を3~5日間経口投与。	1	19	大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オンコピン注射用 1mg:1mg/m ² Day1 ブドウ糖注射液 (5%100mL):1瓶 Day1 注射用テラルビシン(規格なし):30mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:500mg/m ² Day1
52	Gemcitabine			15	13 グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day8 Day15 ゲムシタピン点滴静注液(規格なし):1000mg/m ² Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day8 Day15
53	CHASE	エンドキサン開始6時間前~終了24時間後までメイロンを含む80mL/時以上の補液が必要。	3	18	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):5瓶 Day1 Day2 Day3 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 注射用エンドキサン500mg:1200mg/m ² Day1 イトボシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット):100mg/m ² Day1 Day2 Day3 大塚生食注(250mL):1袋 Day2 Day3 キロサイドN注400mg:2000mg/m ² Day2 Day3
54	DHAP			4	17 グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):5瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン点滴静注(規格なし):25mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注(250mL):1袋 Day2 キロサイドN注400mg:2000mg/m ² Day2 ヒドコロチンコハク酸エステルNa注射用100mg「武田テハ」:1瓶 Day2
55	ESHAP			5	23 生食(100mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ソル・メドロール静注用500mg(溶解液8mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 シスプラチン点滴静注(規格なし):25mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 イトボシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット):40mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 大塚生食注(250mL):1袋 Day5 キロサイドN注400mg:2000mg/m ² Day5
56	MTX大量			5	9 メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL瓶):3500mg/m ² Day1 ロイコポリン注3mg (1mL):15mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1
58	CPT-11	1週毎に2~3回繰り返し、少なくとも2週間休薬する。	3	4	グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day2 Day3 イリノテカン塩酸塩点滴静注液「トー」(規格なし):40mg/m ² Day1 Day2 Day3
59	M-FEPA	MTXの投与に際して、Ccr 60mL/min以上であることを確認。	3	4	ソルテム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day2 Day3 メイロン (7%20mL):1管 Day1 Day2 Day3 グラセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 生食(20mL):1管 Day1 注射用メソトレキセート50mg:100mg/m ² Day1 生食(500mL):1瓶 Day1 注射用メソトレキセート50mg:300mg/m ² Day1 ロイコポリン注3mg (1mL):5管 Day2 Day3

60	大量Ara-C(PCNSL)	2コースの地固め療法として行う。	2	26	生食(500mL瓶):1瓶 Day2 Day1 キロサイドN注400mg:3000mg/m ² Day2 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 Day2 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day8 Day15
64	Pralatrexate	投与10日以上前から葉酸 1.0~1.25mg 内服、VB12 1mg 筋注。週1回投与を6週 連続で行い、7週目は休薬する。	15	6	生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 ジフォルタ注射液20mg(1mL瓶):30mg/m ² Day1 Day8 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day3 Day2 Day8 Day15
66.1	Obinutuzumab + Bendamustine (初回)	ガザイハ投与開始30分前に、カロナール 500mg2錠とレスタミン10mg5錠内服。6コース 終了後、維持療法を行う。	15	13	ソル・メドロール静注用40mg(溶解液1mL):2瓶 Day1 Day8 Day15 大塚生食注(250mL):1袋 Day8 Day15 ガザイハ点滴静注1000mg(1000mg/40mL):1瓶 Day8 Day15 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day3 Day2 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day3 Day2 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day3 Day2 トレアキシン点滴静注液100mg(4mL瓶):90mg/m ² Day3 Day2 生食(100mL):1瓶 Day1 Day3 Day2
66.2	Obinutuzumab + Bendamustine (2回目以降)	ガザイハ投与開始30分前に、カロナール 500mg2錠とレスタミン10mg5錠内服。6コース 終了後、維持療法を行う。	3	25	ソル・メドロール静注用40mg(溶解液1mL):2瓶 Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day3 Day2 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day3 Day2 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day3 Day2 トレアキシン点滴静注液100mg(4mL瓶):90mg/m ² Day3 Day2 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ガザイハ点滴静注1000mg(1000mg/40mL):1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
68	Obinutuzumab (維持)	ガザイハ投与開始30分前に、カロナール 500mg2錠とレスタミン10mg5錠内服。維持 療法は2ヶ月毎に2年間行う。	1	55	ソル・メドロール静注用40mg(溶解液1mL):2瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ガザイハ点滴静注1000mg(1000mg/40mL):1瓶 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
57-1	Brentuximab Vedotin (<50mg)	アドセトリスの投与量によってレジメンを選択す る。	1	20	生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 注射用水(20mL管):0.36mL/kg Day1 アドセトリス点滴静注用50mg:1.8mg/kg Day1 生食(100mL):1瓶 Day1
57-2	Brentuximab Vedotin (≥50mg)	アドセトリスの投与量によってレジメンを選択す る。	1	20	注射用水(20mL管):0.36mL/kg Day1 アドセトリス点滴静注用50mg:1.8mg/kg Day1 ソルデム3A輸液(500mL):1袋 Day1 Day15
79-1	BV + AVd (BV < 50mg)	アブレピタント(day1~3, 15~17)は主治医 判断。最大6コース。アドセトリスの投与量 によってレジメンを選択する。	15	13	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day15 イクザール注射用10mg:6mg/m ² Day1 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day15 ドキシソルピシン塩酸塩注射液(規格なし):25mg/m ² Day1 Day15 生食(500mL):1瓶 Day1 Day15 注射用水(20mL管):3管 Day1 Day15 ダカルバジン注用100:250mg/m ² Day1 Day15 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 注射用水(20mL管):0.24mL/kg Day1 Day15 アドセトリス点滴静注用50mg/瓶:1.2mg/kg Day1 Day15 生食(100mL瓶):1瓶 Day15

79-2	BV+AVd (BV ≥ 50mg)	アブレタント(day1~3, 15~17)は主治医判断。最大6コース。アドセトリスの投与量によってレジメンを選択する。	15	13	ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 Day15 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day15 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day15 エクザール注射用10mg:6mg/m ² Day1 Day15 生食(100mL):1瓶 Day1 Day15 ドキシソルピシン塩酸塩注射用(規格なし):25mg/m ² Day1 Day15 生食(500mL):1瓶 Day1 Day15 注射用水(20mL管):3管 Day1 Day15 ダカルバジン注用100:250mg/m ² Day1 Day15 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day15 注射用水(20mL管):0.24mL/kg Day1 Day15 アドセトリス点滴静注用50mg/瓶:1.2mg/kg Day1 Day15 ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用(規格なし):50mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1
83-1	BV+CHP (BV < 50mg)	day1~5にプレドニン100mg/日内服を併用。アブレタント併用は主治医判断。アドセトリスの投与量によってレジメンを選択。	1	20	注射用エンドキサン500mg:750mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 注射用水(20mL管):0.36mL/kg Day1 アドセトリス点滴静注用50mg/瓶:1.8mg/kg Day1 ハロセトロン点滴静注バッグ0.75mg/50mL「タイホウ」:1袋 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ドキシソルピシン塩酸塩注射用(規格なし):50mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1
83-2	BV+CHP (BV ≥ 50mg)	day1~5にプレドニン100mg/日内服を併用。アブレタント併用は主治医判断。アドセトリスの投与量によってレジメンを選択。	1	20	注射用エンドキサン500mg:750mg/m ² Day1 ソルデム3A輸液 (500mL):1袋 Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 注射用水(20mL管):0.36mL/kg Day1 アドセトリス点滴静注用50mg/瓶:1.8mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day2 トリアキシン点滴静注液100mg(4mL瓶):90mg/m ² Day1 Day2 生食(100mL瓶):1瓶 Day2
84-1	Polatuzumab Vedotin+Bendamustine (Pola < 75mg)	day1:リツキンマブ投与。day2:ボライビーは忍容性よければ、2回目以降は30分まで短縮可。	2	19	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day2 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day2 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 注射用水(20mL管):0.09mL/kg Day1 ボライビー点滴静注用(規格なし):1.8mg/kg Day1 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day2 トリアキシン点滴静注液100mg(4mL瓶):90mg/m ² Day1 Day2 生食(100mL瓶):1瓶 Day2 Day1
84-2	Polatuzumab Vedotin+Bendamustine (Pola ≥ 75mg)	day1:リツキンマブ投与。day2:ボライビーは忍容性よければ、2回目以降は30分まで短縮可。	2	19	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day2 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day2 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 注射用水(20mL管):0.09mL/kg Day1 ボライビー点滴静注用(規格なし):1.8mg/kg Day1 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生食(500mL):1瓶 Day1 注射用エンドキサン500mg:800mg/m ² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day8 Day15 Day22 ダウノマイシン(20mg):30mg/m ² Day1 Day2 Day3 オンコピン注射用1mg:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22
34	ALL-97変法	day1~7のプレドニン(60mg/m ²)は経口投与。	22	6	

78	Ph+ALL208IMA 寛解導入療法	day1-21 PSL 60mg/m ² , day8-42 Imatinib 600mg。アブレピタント。60歳以上: CY 800mg/m ² , DNR 30mg/m ² , PSL day1-7	22	20	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HKJ」:1袋 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 Day3 オンコピン注射用1mg:1.3mg/m ² Day1 Day8 Day15 Day22 生食(100mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 ダウノマイシン静注用20mg/瓶:60mg/m ² Day1 Day2 Day3 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 注射用エンドキサン500mg:1200mg/m ² Day1
80	Ph+ALL208IMA 地固め療法 C1	day1 MTX+Ara-C+DEX 髄注。day4-21 Imatinib 600mg。アブレピタント、ステロイド点眼薬。60歳以上:Ara-C 1,000mg/m ²	4	24	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HKJ」:1袋 Day1 Day2 Day3 生食(500mL瓶):1瓶 Day2 Day3 Day1 キロサイドN注400mg(20mL管):2000mg/m ² Day2 Day3 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 ソル・メドロール静注用40mg(溶解液1mL):50mg Day1 Day2 Day3 ロイコボリン注3mg(1mL管):15mg Day3 Day4 Day2 メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL瓶):900mg/m ² Day1 メソトレキセート点滴静注液200mg(8mL瓶):100mg/m ² Day1
81	Ph+ALL208IMA 地固め療法 C2	day1 MTX+Ara-C+DEX 髄注。day1-7 PSL 60mg/m ² , day2-21 Imatinib 600mg。アブレピタント。C1→C2を4回繰り返す	1	27	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HKJ」:1袋 Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オンコピン注射用1mg:1.3mg/m ² Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ダウノマイシン静注用20mg/瓶:60mg/m ² Day1 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 注射用エンドキサン500mg:1200mg/m ² Day1
82	Ph+ALL208IMA 維持療法	day1-5 PSL 60mg/m ² , day1-28 Imatinib 600mg。寛解到達後2年目まで4週ごとに継続する。	1	27	生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 オンコピン注射用1mg:1.3mg/m ² Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1
28	DA(寛解導入療法)	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	7	21	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HKJ」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生食(100mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ダウノマイシン(20mg):50mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生食(100mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 キロサイド注(規格なし):100mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
29	MA(地固め療法)		5	23	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HKJ」:1袋 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3 生食(500mL):1瓶 Day4 Day5 Day1 Day2 Day3 キロサイド注(規格なし):200mg/m ² Day4 Day5 Day1 Day2 Day3 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 Day2 Day3 ノバントロン注10mg(5mL瓶):7mg/m ² Day1 Day2 Day3
30	DA(地固め療法)	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	5	23	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HKJ」:1袋 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3 生食(100mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 ダウノマイシン(20mg):50mg/m ² Day1 Day2 Day3 生食(500mL):1瓶 Day1 Day4 Day5 Day2 Day3 キロサイド注(規格なし):200mg/m ² Day1 Day4 Day5 Day2 Day3
31	AA(地固め療法)	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	5	23	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HKJ」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注(規格なし):200mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食(100mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 アクラシノン注射用20mg:20mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5

32	AVVV(地固め療法)	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	10	18	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HKJ」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注(規格なし):200mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 ブドウ糖注射液5%(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 エトポシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット):100mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 生食(20mL):1管 Day8 Day10 オンコピン注射用1mg:0.8mg/m ² Day8 注射用フィルデシン(規格なし):2mg/m ² Day10
33	CAG	day1~28にG-CSF投与。65歳以上はアクリン10mg/m ² 。	14	14	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HKJ」:1袋 Day1 Day2 Day3 Day4 生食(500mL):1瓶 Day1 Day5 Day6 Day7 Day8 Day10 Day11 Day9 Day12 Day13 Day14 Day2 Day3 Day4 キロサイド注(規格なし):20mg/m ² Day1 Day5 Day6 Day7 Day8 Day10 Day11 Day9 Day12 Day13 Day14 Day2 Day3 Day4 生食(100mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 アクリン注射用20mg:14mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4
65	IDR+AraC	アブレピタント(day1:125mg, day2~3:80mg)併用。	5	16	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HKJ」:1袋 Day1 Day2 Day3 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day2 Day3 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 注射用水(20mL管):1管 Day1 Day2 Day3 イダマイシン静注用5mg/瓶:12mg/m ² Day1 Day2 Day3 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 キロサイド注(規格なし):140mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5
38	(SC)Azacitidine(day1~7)		7	21	注射用水(20mL):1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 ピダーザ注射用100mg:75mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
39	(SC)Azacitidine(day1~5, 8~9)		9	19	注射用水(20mL):1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 ピダーザ注射用100mg:75mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9
40	(DIV)Azacitidine(day1~7)		7	21	生食(20mL):1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 注射用水(20mL管):1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7 ピダーザ注射用100mg/瓶:75mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day6 Day7
41	(DIV)Azacitidine(day1~5, 8~9)		9	19	生食(20mL):1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 注射用水(20mL管):1管 Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9 ピダーザ注射用100mg/瓶:75mg/m ² Day1 Day2 Day3 Day4 Day5 Day8 Day9
42	Mogamulizumab	必要により解熱鎮痛剤(アセトアミノフェン等)の前投与を行う。週1回(化学療法併用の場合, 2週に1回), 8回投与。	1	0	生食(100mL):1瓶 Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 ポテジオ点滴静注20mg:1mg/kg Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):1瓶 Day1 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day1
45	VCAP	day2~6にG-CSF投与。	1	6	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HKJ」:1袋 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 オンコピン注射用1mg:1mg/m ² Day1 ドキソルピジン塩酸塩注射用(規格なし):40mg/m ² Day1 大塚生食注(250mL):1袋 Day1 注射用エンドキサン500mg:350mg/m ² Day1 水溶性プレドニン(規格なし):40mg/m ² Day1
46	AMP	day2~6にG-CSF投与。	1	6	グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HKJ」:1袋 Day1 生食(100mL):1瓶 Day1 ドキソルピジン塩酸塩注射用(規格なし):30mg/m ² Day1 注射用サイメリン50mg:60mg/m ² Day1 水溶性プレドニン(規格なし):40mg/m ² Day1 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1

47	VECP	day4~13にG-CSF投与。day2, 3のプレドニンは経口投与。	3	11	<p>グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」50mL:1瓶 Day1 Day2 Day3 生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 注射用フィルデシン(規格なし):2.4mg/m² Day1 ブドウ糖注射液5%(500mL袋):1袋 Day1 Day2 Day3 イトボシド点滴静注液100mg「サンド」(ラステット):100mg/m² Day1 Day2 Day3 生食(500mL):1瓶 Day1 カルボプラチン点滴静注液(規格なし):250mg/m² Day1 水溶性プレドニン(規格なし):40mg/m² Day1 大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day2 Day3 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ト-7」:20mg Day1 Day2 Day3 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL:10mg Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3</p>
60	CDDP(10mg)+CPT-11(20mg)		3	1	<p>大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day2 Day3 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ト-7」:20mg Day1 Day2 Day3 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL:10mg Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3</p>
63	CDDP(20mg)+CPT-11(40mg)		3	1	<p>大塚糖液5%(250mL):1袋 Day1 Day2 Day3 イリノテカン塩酸塩点滴静注液40mg「ト-7」:40mg Day1 Day2 Day3 生食(500mL):1瓶 Day1 Day2 Day3 シスプラチン点滴静注10mg「マルコ」20mL:20mg Day1 Day2 Day3 グラニセトロン点滴静注液バッグ1mg/50mL「HK」:1袋 Day1 Day2 Day3 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day2 Day3</p>
85	(SC)DCyBorD(1~2コース)	前投薬はDEX(20mg/day)、アセトアミノフェン、ジフェンヒドラン。CY 300mg/m ² (max500mg)も併用。(DEXは前投薬はDEX(20mg/day)、アセトアミノフェン、ジフェンヒドラン。CY 300mg/m ² (max500mg)も併用。(DEXは	22	6	<p>ベルケイド注射用3mg/瓶:1.3mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22 ダラキューロ配合皮下注(15mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 ダラキューロ配合皮下注(15mL瓶):1瓶 Day1 Day15 生食(20mL):1管 Day1 Day8 Day15 Day22 ベルケイド注射用3mg/瓶:1.3mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22</p>
86	(SC)DCyBorD(3~6コース)	前投薬はDEX(20mg/day)、アセトアミノフェン、ジフェンヒドラン。CY 300mg/m ² (max500mg)も併用。(DEXは	22	6	<p>生食(20mL):1管 Day1 Day8 Day15 Day22 ベルケイド注射用3mg/瓶:1.3mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22</p>
87	(SC)DCyBorD(7~24コース)	前投薬はDEX(20mg/day)、アセトアミノフェン、ジフェンヒドラン。	1	27	<p>ダラキューロ配合皮下注(15mL瓶):1瓶 Day1</p>
43	(SC)Bortezomib±Dexamethasone	day2, 5, 9, 12はデキサメタゾン10mg/body経口投与。	11	10	<p>生食(100mL):1瓶 Day1 Day4 Day8 Day11 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):2瓶 Day1 Day4 Day8 Day11 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg相当):2管 Day1 Day4 Day8 Day11 生食(20mL):1管 Day1 Day4 Day8 Day11 ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」/瓶:1.3mg/m² Day1 Day4 Day8 Day11 生食(20mL):1管 Day1 Day8 Day15 Day22 ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」/瓶:1.3mg/m² Day1 Day8 Day15 Day22</p>
53	(SC)Bortezomib(維持)	副腎皮質ステロイド(レナテックス等)を適宜併用。	22	13	<p>生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 Day22 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 大塚生食注(250mL):230mL Day1 Day8 Day15 Day22 注射用水(20mL管):0.4mL/kg Day1 Day8 Day15 Day22 エムプリシチ点静注用400mg/瓶:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22</p>
61	Elotuzumab(1,2コース目)	カロナール500mg 1錠、レスタミン10mg 3錠内服。レプラト、レナテックス併用。	22	6	<p>生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day8 Day15 Day22 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22 大塚生食注(250mL):230mL Day1 Day8 Day15 Day22 注射用水(20mL管):0.4mL/kg Day1 Day8 Day15 Day22 エムプリシチ点静注用400mg/瓶:10mg/kg Day1 Day8 Day15 Day22</p>
62	Elotuzumab(3コース目以降)	カロナール500mg 1錠、レスタミン10mg 3錠内服。レプラト、レナテックス併用。	15	13	<p>生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg相当):1瓶 Day1 Day15 ファモチジン静注20mg「日新」(20mL管):1管 Day1 Day15 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day15 大塚生食注(250mL):230mL Day1 Day15 注射用水(20mL管):0.4mL/kg Day1 Day15 エムプリシチ点静注用400mg/瓶:10mg/kg Day1 Day15</p>

97	Cd (1コース目)	前投薬はDEX (40mg/day)。DEXはday22も40mg/day(9コースまで)。	15	13	生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液5%(100mL瓶):1瓶 Day15 Day8 注射用水(20mL管):35mL/㎡ Day15 Day8 カイプロリス点滴静注用(規格なし):70mg/㎡ Day15 Day8 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 注射用水(20mL管):10mL/㎡ Day1 カイプロリス点滴静注用(規格なし):20mg/㎡ Day1
98	Cd (2コース目～)	前投薬はDEX (40mg/day)。DEXはday22も40mg/day(9コースまで)。	15	13	生理食塩液「ヒカリ」(50mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 ブドウ糖注射液5%(100mL瓶):1瓶 Day8 Day15 注射用水(20mL管):35mL/㎡ Day8 Day15 カイプロリス点滴静注用(規格なし):70mg/㎡ Day8 Day15 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 生食(100mL瓶):1瓶 Day8 Day15 Day22
69	DLd (1、2コース目)	ダラザレックス投与開始1-3時間前に、カロナール500mg 2錠、モンテルカスト10mg 1錠内服。レブラミド 3週投与、1週休薬。	22	6	デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):5瓶 Day8 Day15 Day22 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day8 Day15 Day22 生食(500mL瓶):1瓶 Day8 Day15 Day22 ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day8 Day15 Day22 テルモ生食(1000mL):1袋 Day1
70	DLd (3～6コース目)	day1,15 カロナール500mg 2錠、モンテルカスト10mg 1錠内服。レブラミド 3週投与、1週休薬。day8,22 レナテックス40mg内服。	15	13	生食(100mL瓶):1瓶 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):5瓶 Day15 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day15 生食(500mL瓶):1瓶 Day15 ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day15 生食(500mL瓶):1瓶 Day1
71	DLd (7コース目～)	day1 カロナール500mg 2錠、モンテルカスト10mg 1錠内服。レブラミド 3週投与、1週休薬。day8,15,22 レナテックス40mg内服。	1	27	ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):5瓶 Day1 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day1
72	DMPB (1コース目)	ダラザレックス投与1-3時間前に、カロナール500mg 2T,モンテルカスト10mg 1T。day1-4 アルケラン 9mg/m2,day2-4 プレドニン 60mg/m2。	36	6	生食(20mL管):1管 Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」/瓶:1.3mg/㎡ Day4 Day8 Day11 Day22 Day25 Day29 Day32 生食(100mL瓶):1瓶 Day8 Day22 Day29 Day36 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):2瓶 Day8 Day22 Day29 Day36 Day15 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day8 Day22 Day29 Day36 Day15 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day8 Day22 Day29 Day36 Day15 生食(500mL瓶):1瓶 Day29 Day36 Day8 Day15 Day22 ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day29 Day36 Day8 Day15 Day22 テルモ生食(1000mL):1袋 Day1
73	DMPB (2～9コース目)	ダラザレックス投与1-3時間前に、カロナール500mg 2T,モンテルカスト10mg 1T。day1-4 アルケラン 9mg/m2,day2-4 プレドニン 60mg/m2。	29	13	生食(20mL管):1管 Day8 Day22 Day29 Day1 ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」/瓶:1.3mg/㎡ Day8 Day22 Day29 Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day22 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):2瓶 Day22 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day22 Day1 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day22 Day1 生食(500mL瓶):1瓶 Day22 Day1 ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day1 生食(500mL瓶):1瓶 Day1
74	DMPB (10コース目～)	ダラザレックス投与開始1-3時間前に、カロナール500mg 2錠、モンテルカスト10mg 1錠内服。	1	27	ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 ポラミン注5mg(1mL管):1管 Day1

75	DBd (1~3コース目)	ダラザレックス投与開始1-3時間前に、コナール500mg 2錠、モンテルカスト10mg 1錠 内服。day2, 9 レナデックス 20mg 内服。	15	6	生食(20mL管):1管 Day8 Day1 ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」/瓶:1.3mg/m ² Day8 Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day8 Day15 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):2瓶 Day8 Day15 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day8 Day15 ポララミン注5mg(1mL管):1管 Day8 Day15 生食(500mL瓶):1瓶 Day8 Day15 ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day8 Day15 テルモ生食(1000mL):1袋 Day1
76	DBd (4~8コース目)	ダラザレックス投与開始1-3時間前に、コナール500mg 2錠、モンテルカスト10mg 1錠 内服。day2, 8, 9 レナデックス 20mg 内服。	8	13	生食(20mL管):1管 Day8 Day1 ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」/瓶:1.3mg/m ² Day8 Day1 生食(500mL瓶):1瓶 Day1 ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 ポララミン注5mg(1mL管):1管 Day1
77	DBd (9コース目~)	ダラザレックス投与開始1-3時間前に、コナール500mg 2錠、モンテルカスト10mg 1錠 内服。	1	20	生食(500mL瓶):1瓶 Day1 ダラザレックス点滴静注(規格なし):16mg/kg Day1 生食(100mL瓶):1瓶 Day1 デキサート注射液6.6mg(リン酸エステル8mg)(2mL管):2瓶 Day1 デキサート注射液1.65mg(リン酸エステル2mg)(0.5mL管):2管 Day1 ポララミン注5mg(1mL管):1管 Day1
88	DPd (1~2コース目)	前投薬はDEX(20mg/day)、アセトアミノフェン、ジフェントラミン、ホマリトミド(day1-21)も併用。(DEXは翌日も20mg/day)	22	6	ダラキユーロ配合皮下注(15mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22
89	DPd (3~6コース目)	前投薬はDEX(20mg/day)、アセトアミノフェン、ジフェントラミン、ホマリトミド(day1-21)も併用。(DEXは翌日も20mg/day)	15	13	ダラキユーロ配合皮下注(15mL瓶):1瓶 Day1 Day15
90	DPd (7~24コース目)	前投薬はDEX(20mg/day)、アセトアミノフェン、ジフェントラミン、ホマリトミド(day1-21)も併用。(DEXは翌日も20mg/day)	1	27	ダラキユーロ配合皮下注(15mL瓶):1瓶 Day1
91	DBd (SC, 1~3コース目)	前投薬はDEX(20mg/day)、アセトアミノフェン、ジフェントラミンを内服。(day1,8 DEXは翌日も20mg/day)	15	6	生食(20mL管):1管 Day1 Day8 ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」/瓶:1.3mg/m ² Day1 Day8 ダラキユーロ配合皮下注(15mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15
92	DBd (SC, 4~8コース目)	前投薬はDEX(20mg/day)、アセトアミノフェン、ジフェントラミンを内服。(DEXは翌日も20mg/day)	8	13	生食(20mL管):1管 Day1 Day8 ボルテゾミブ注射用3mg「DSEP」/瓶:1.3mg/m ² Day1 Day8 ダラキユーロ配合皮下注(15mL瓶):1瓶 Day1
93	DBd (SC, 9コース目~)	前投薬はDEX(20mg/day)、アセトアミノフェン、ジフェントラミンを内服。	1	27	ダラキユーロ配合皮下注(15mL瓶):1瓶 Day1
94	DLd (1~2コース目)	前投薬はDEX(20mg/day)、アセトアミノフェン、ジフェントラミン、レナリトミド(day1-21)も併用。(DEXは翌日も20mg/day)	22	6	ダラキユーロ配合皮下注(15mL瓶):1瓶 Day1 Day8 Day15 Day22
95	DLd (3~6コース目)	前投薬はDEX(20mg/day)、アセトアミノフェン、ジフェントラミン、レナリトミド(day1-21)も併用。(DEXは翌日も20mg/day)	15	13	ダラキユーロ配合皮下注(15mL瓶):1瓶 Day1 Day15
96	DLd (7コース目~)	前投薬はDEX(20mg/day)、アセトアミノフェン、ジフェントラミン、レナリトミド(day1-21)も併用。(DEXは翌日も20mg/day)	1	27	ダラキユーロ配合皮下注(15mL瓶):1瓶 Day1